




Oficiul fitosanitar Dolj
Bvd. N. Romanescu nr. 39D
Craiova, 200738
T +40(251) 448191
ofdolj@anf.ro

Nr. 16/05.01.2022

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.1



Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: în spații protejate sere solarii (o scurtă descriere a organismului daunator și modul de atac, fotografie mod de atac)

Se recomandă efectuarea tratamentelor în spații protejate, sere, solarii):

Pentru producerea unor rasaduri sanatoase se impune realizarea unor lucrări premergătoare, cum ar fi:

1. Dezinfecția solului și a substratului de cultura destinat culturilor de legume timpurii (în spații închise)

2. Dezinfecția amestecului de pământ necesar producerii de răsaduri

● **Dezinfecția solului, a amestecului de pământ din sere și solarii** pentru combaterea bacteriilor și ciupercilor de sol, a insectelor, nematozilor și a semintelor de buruieni se poate realiza:

1. Dezinfecția solului și a substratului de cultura destinat culturilor de legume timpurii (în spații închise)

2. Dezinfecția amestecului de pământ necesar producerii de răsaduri

Dezinfecția solului, a amestecului de pământ din sere și solarii pentru combaterea bacteriilor și ciupercilor de sol, a insectelor, nematozilor și a semintelor de buruieni se poate realiza cu:

1. Nemasol (TM) 510 (fumigant de sol cu acțiune nematocida, fungicida, erbicida insecticida- 700-1000 l / ha (0.07 – 0.1 l / mp) aplicare prin irigare , cu cel puțin 21 zile înainte de plantare.

2. Basamid Granule (2) Sterilizant de sol cu acțiune nematocida, insecticida și fungicida -500 kg / ha (0.05 kg / mp). Aplicarea granulelor prin incorporare înainte de plantare, pe sol umed .

3. Velum Prime 400 SC: utilizare în sere/ spații protejate, pentru combaterea nematozilor și a făinării prin aplicare la sol odată cu apa de irigație – 625 ml/ha în 2000-6000 l apă; Se vor efectua 2 tratamente, per ciclu de producție și pe an la un interval de 15 - 30 zile între tratamentele succesive. Doza maximă este de 1250 ml/ha/an. Primul tratament se recomandă a se efectua cu 1 – 3 zile înainte de plantarea răsadului, urmat de al doilea tratament la 15 – 30 de zile după finalizarea transplantării. Velum Prime 400 SC trebuie aplicat pe un teren udat anterior pentru a favoriza activarea și preluarea produsului în plante.

În vegetație nematozii galicoli ai legumelor se combat cu:

1. Nemathorin 10 G (nematocizi și viermi sarma din sere și solarii) . Doza : 15,0 kg/ha, aplicat pe rand cu incorporare la 8-10 cm. adâncime .

Este bine ca solul tratat să fie acoperit cu o folie de plastic pe o perioadă de timp și care va fi ridicată cu o săptămână înainte de semănat.

Dezinfecția amestecului de pământ necesar producerii de rasaduri sau **repicatului** se recomandă în cazul realizării patului de amestec de pământ din gospodăria proprie- pământ de telina, pământ de frunze, mranita și se face termic prin căldura umedă sau uscată (14 zile timp de pauză) și/sau chimic cu unul din produsele:

1. Previcur Energy - 3,0 l / ha, aplicat prin picurare

2. MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG- 0,15 % (4-5 l sol./mp)

3. FOLPAN 80 WDG (FLOVINE- a doua denumire)- 0,15% (4-5 l sol./mp);

Dezinfecția uneltelor, tocurelor de rasadnita, aleilor cu soluții pe baza de Cupru + tiofanat metil.

De asemenea se va dezinfecta scheletul serelor cu atomizorul cu flacără.

Mai pot fi și alte produse de protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare.

Alte recomandări:

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiei si Dezvoltarii Rurale, Ordinul nr.15b/3404/1991 al Dep. pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor , precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.



Responsabil Prognoza si Avertizare,
Draganeanu Elisabeta