

BULETIN DE AVERTIZARE NR.11

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **MUSCA CEPEI SI USTUROIULUI (DELIA ANTIQUE), TRIPS TABACI+MANA (PERONOSPORA DESTRUCTOR).**

(o scurta descriere a organismului daunator si modul de atac, fotografie mod de atac)


MANA CEPEI



MUSCA USTUROIULUI



TRIPS TABACI



Se recomanda efectuarea tratamentelor la (cultura). **CEAPA+USTUROI** :cu

1. ALLSTAR 250 SC -0,75-1,0 l /ha+BENEVIA- 0,75 l sau
2. ALIETTE 80 WG -2kg/ha+KATATE ZEON-0,02% sau
3. CUPROFIX ULTRA-1,4-1,8 kg/ha+ KATATE ZEON-0,02%

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

MANA CEPEI

Vremea racoroasa si umeda favorizeaza aparitia si raspandirea uneia dintre cele mai pagubitoare boli ale cepei - Mana cepei (Peronospora destructor). Atacul afecteaza atat cultura de ceapa pentru bulbi, cat si culturile de seminceri si de productie de arpagic. Mana la ceapa se manifesta pe frunze si tulpinile florifere. Pe acestea apar pete galbene, concentrice, in dreptul carora se observa un puf cenusiu-violaceu.

Frunzele și tijele plantelor atacate se înmoaie și se frâng în dreptul zonei afectate (asa încât în partea superioară se usuca) cazând la pământ. În cazul unui atac puternic, sunt atacați și bulbi, aceștia rămânând mici, iar în timpul depozitării se înmoaie și putrezesc. Transmiterea bolii de la un an la altul este asigurată prin sporii ce rămân în resturile vegetale și bulbii infectați. În vegetație se răspândește prin conidii. Boala apare în toate culturile de ceapă atunci când vremea este ploioasă și rece și este foarte pagubitoare în special pentru culturile de seminceri de ceapă.

- **Se va respecta, cu strictete, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și recoltarea cepei, în cazul în care aceasta se comercializează ca ceapă verde, în funcție de produsele utilizate.**
- **Ceapa pentru stufat nu se tratează.**

Tripsul cepei

Este întâlnit pretutindeni cu preponderență în zonele de câmpie, atât în sere solarii cât și în câmp. În serele încălzite se înmulțește tot timpul anului, iar în rest iernează în sol. Populația de trips într-o cultură se poate dezvolta în timp foarte scurt, poate avea 5-6 generații pe an, înmulțindu-se pe cale asexuată. Femela depune 30-50 ouă în țesuturile funzelor, florilor sau fructelor plantelor gazdă. Larvele se hrănesc cu respectivele țesuturi, iar o generație completă a tripsului, în funcție de condițiile de mediu, trăiește aproximativ 15-40 zile.

Larvele și adulții se poziționează în spațiile dintre frunzele de ceapă, unde înțeapă și sug seva plantei, provocând daune importante plantelor tinere.

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentării 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Toți utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate - SMR 10. Aceștia au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și să țină evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani!

Înainte de utilizarea instalației de aplicat PPP, verificați dacă aceasta corespunde din punct de vedere tehnic, se va instrui operatorul pe linie de utilizare a PPP și întocmiți procese verbale.

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP **Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecția Plantelor** /2016 postat pe site-ul MADR: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței PPP pe care le utilizează, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----
Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată/ doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU Iuliana



**Emitent,
GIUGEA Stefan**

BULETIN DE AVERTIZARE NR.12

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: boli vasculare **Fuzarioza (FUZARIUM OXISPORIUM)**, **VESTEJIREA PLANTELOR (VERTICILLIUM DAHLIAE)**

(o scurtă descriere a organismului daunator și modul de atac, fotografie mod de atac)

FUZARIOZA

VERTICILLIUM



Se recomanda efectuarea tratamentelor la spatii protejate cu:

1. PREVICUR ENERGY-3 ml/m² (tratament aplicat la sol)
-3 l/ ha (tratament prin picurare)

Alte produse de protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare.

Alte recomandări:

Verticilioza tomatelor (*Verticillium dahliae*)

Această boală produce simptome evidente în faza de coacere a fructelor. Pe frunze apar zone galbene, marginale sau centrale, care se usucă. Plantele se ofilesc ziua, iar seara au un aspect normal. Totuși, după câteva zile, ofilirea este ireversibilă. Plantele atacate fructifică puțin, iar fructele sunt de slabă calitate. Dacă se execută o secțiune prin vasele conducătoare ale plantelor atacate, se poate observa miceliul ciupercii ce blochează circulația sevei. Verticilioza se poate confunda foarte ușor cu fuzarioza, având simptome asemănătoare. Ciuperca trăiește în sol, iar când condițiile de mediu sunt prielnice, poate pătrunde în planta prin rănilor produse la nivel radicular.

Fuzarioza (FUZARIUM OXISPORIUM) este o boală periculoasă care ataca culturile de tomate, ardei, vinete, etc și este provocată de *Fusarium oxysporium*, o ciuperca transmisă de sol ce infectează plantele prin rădăcini și colonizează vasele xilemului.

Ciuperca apare în special în zonele cu climă caldă și provoacă putrezirea rădăcinii și a coletului, determinând pierderi severe care afectează calitatea și cantitatea producției.

La rasadurile afectate se observă o scădere a turgescenței frunzelor, o reducere a creșterii. Frunzuletele bazale se îngălbenesc, se curbează, ducând la ofilirea totală a plantei și la moartea sa. La plantele mature, un simptom ar fi îngălbenirea celor mai mature frunze (cele bazale). Îngălbenirea treptată a plantei este însoțită de ofilire. Ofilirea fiind din ce în ce mai accentuată, ducând la moartea plantei. Frunzele afectate își pierd turgescența și succesiv se îngălbenesc, se ofilesc și mor, adesea înainte ca planta să ajungă la maturitate.

Pe masura ce boala progresa, cresterea incetineste iar tructele nu se mai dezvoltă. La infectia cu aceasta ciuperca, plantele dezvoltă radacini adventive.

Raspandirea bolii pe distante scurte se face prin stropi de apa, unelte si echipamente, iar pe distante lungi prin plante infectate. De exemplu, atunci cand efectuam aratura pentru a putea planta, utilajul agricol cu care am efectuat acesta lucrare tehnologica trebuie sa fie dezinfectat inainte, deoarece noi nu stim in ce soale a mai fost utilizat si cu ce este infectat. Rasadul se poate infecta din amestecul pe care il procuram de obicei din turba si pamanat. Chiar daca turba este sterilizata, pamantul folosit poate fi infectat si asa se infecteaza rasadul.

Pe soluri cu conditii favorabile dezvoltarii bolii se vor cultiva soiuri rezistente sau hibrizi altoiti pe port altoi cu rezistenta.

In prima saptamana de la plantare daca se constata atac de daunatori(musculita de sera, trips,acarieni) se recomanda tratamente chimice cu produse de protectia plantelor omologate.

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiei 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor , precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată/ doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

COORDONATOR
DANCIU Tulliana




Emitent,
GIUGEA Stefan

BULETIN DE AVERTIZARE NR.13

Pentru prevenirea si combaterea organismului daunator: CYDALIMA PERSPECTALIS (OMIDA PAROASA A BUXUSULUI)

OMIDA PAROSA A BUXUSULUI



Se recomanda efectuarea tratamentelor la (cultura) BUXUSULUI cu:
 KARATE ZEON-0,015% (omizi defoliatoare)

OMIDA PAROASA A BUXUSULUI

Larvele (omida paroasa) care ataca speciile de buxus, au culoare verde cu linii si puncte longitudinale negre si perisori de-a lungul corpului. Larvele se hranesc cu frunze, producand uneori chiar defolierea totala, conducand la uscarea si pierderea plantei. Devoreaza masiv din interiorul plantei spre exterior, iar acest mod face ca semnele atacului sa nu fie observate si interventia sa fie uneori tardiva, cum a fost si in cazul meu. Larvele mici se hranesc cu partea superioara a frunzei, iar larvele mari mananca complet frunzele, ambele cazuri conducand la uscarea plantei.

Perioada optima de trament: La depistarea larvelor

- Al doilea tratament se aplica la interval de 7-10 zile;
- Efectuarea tratamentului fitosanitar dupa o igiena culturala (taierea si indepartarea crengilor uscate, debile, purtatoare de coconi de iernare);
- Tratamentul se executa la temperatura de 6- 8 grade Celsius si fara vant sau nu mai mare de 4m /secunda;

Recomandari : In zonele urbane alinamente stadale (garduri vii), parcuri, gradini publice (Conform OG 34/2012 Art.12, Alin 3 litera a si litera b).

- se vor efectua tratamente cu respectarea OG 34/2012 Art.12 Alin. 1 si Alin2-in aceste zone specific utilizarea ppp este reduca la minimum sau interzisa.
- se vor adopta masuri adecvate de gestionare a riscurilor si se utilizeaza cu prioritate produse de protectia plantelor cu risc redus astfel cum sunt definite la art.22 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 precum si masuri de control biologic.

-evitarea stationarii si parcarii mijloacelor de transport in zona de aplicare a tratamentelor

-interzicerea accesului pietonal in zona

-respectarea recomandarilor de mai sus in vederea desfasurarii in bune conditiuni a tratamentului si evitarea expunerii trecatorilor la actiunea ppp-urilor.

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si comletarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiri 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie

Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor , precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma(numa/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantitatea utilizată (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

COORDONATOR,

DANCIU Iuliana



EMITENT,

GIUGEA Stefan



BULETIN DE AVERTIZARE NR.14

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA).**



Se recomanda efectuarea tratamentelor la **MAR, PAR, GUTUI** cu:

1. **ALCUPRAL 50 PU-0,2%**(mar- prefloral)
-0,3%(par,gutui) sau
2. **BOUILLIE BORDELAISE WDG-7,5 kg**(mar,par- prefloral) sau
3. **CHAMP 77 WG- 0,2%** (mar- prefloral)sau
4. **CUPROXAT FLOWABLE-0,35%** (mar-prefloral)sau
5. **KOCIDE 2000-0,25%**(mar,par-prefloral) sau
6. **ALIETTE 80 WG-0,3%**(mar,par,gutui)sau
7. **TRIUMF 40 WG-2,0-2,5 kg/ha**(mar,par,gutui)

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Tratatamentul de aplica la PED cand 3-10% din pomi sunt afectati de focul bacterian.

FOCUL BACTERIAN:

- Primele semne apar la inflorit, florile abia "fecundate" se ofilesc si se usuca -capata o culoare bruna negricioasa
- De la floare bacteria trece pe lastari care se ofilesc si capata o culoare bruna, pe acestia aparand scurgeri de exudat bacterian
- Fructele mici capata o culoare neagra- bruna. Pe fructele mari apar pete negre sau brune si exudat bacterian.
- Pomi atacati de focul bacterian arata ca si cum ar fi parjoliti de foc. Bacteria poate conduce la uscare livezilor in doar cateva luni.

Atentie !

In vederea impiedicarii transmiterii agentilor patogeni se recomanda ca in prealabil sa se execute igiena culturala a pomilor pentru distrugerea principalelor forme de iernare a ciupercilor.

Mentionam ca produsele Alcupral 50 PU, Funguran OH 50 WP si Cuproxat Flowable au actiune preventiva pentru rapan si monilioza la mar si par, reducand astfel posibilitatea transmiterii bolii.

Verificati, cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completari ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentatiei 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor , precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 nerespectarea de Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----
Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo gată/ doza folosită	Supra-fața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1) - producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

COORDONATOR,

DANCIU Iuliana



EMITENT,

GIUGEA Stefan